

Com informações de Pedro Morais

Nesta quarta-feira (1º), dia destinado à vacina do Bacilo de Calmette e Guérin (BCG), a Coordenação da Tuberculose e Hanseníase de Olinda faz uma alerta sobre a importância da imunização, única medida para prevenir a doença. Em Olinda, a unidade de referência é a Policlínica João de Barros Barreto, no Carmo, que oferta a vacina com demanda espontânea na segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 17h, bem como acompanhamento e tratamento.

A imunização deve ser realizada no braço e por via intradérmica, dose única, e preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento da criança, ou até quatro anos de idade, caso nunca tenha sido vacinada.

A coordenadora de Olinda, Deisiany Karla de Carvalho explica como prevenir. “Além da vacina é necessário que os contatos de pessoas com a doença sejam avaliados a fim de identificar a infecção, que possibilita prevenir o desenvolvimento de tuberculose ativa, por meio do tratamento para evitar o adoecimento”, detalhou a profissional, que nesse caso é necessário procurar uma unidade de saúde para avaliação.

VACINA - Foi criada em 1921 por Léon Calmette e Alphonse Guérin. Protege contra as formas graves da tuberculose, doença contagiosa, provocada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, que atinge principalmente os pulmões e, se não tratada, pode provocar sérios problemas respiratórios, emagrecimento, fraqueza e até levar à morte.

A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa pelo ar, por meio de tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas são febre ao final do dia, tosse, fraqueza, cansaço e perda de peso. É importante, ainda, como medida de prevenção, manter os ambientes bem ventilados e com entrada da luz solar. Vale ressaltar, que também se faz uso da BCG em casos de contactantes de pacientes com hanseníase. Seguindo o manual do Ministério da Saúde, o uso é válido para todos os contatos de casos de hanseníase assintomáticos, ou seja, que não apresentem sintomas da doença como por exemplo: manchas no

No dia destinado a vacina BCG, Olinda faz alerta sobre importância da imunização | 2

corpo com a finalidade de prevenção primária da doença.

Nesse caso a sua administração é feita em qualquer idade, em dose única em pessoas que não tenham cicatriz vacinal ou com no máximo uma cicatriz.

